


ENCEFALOPATIA IPOSSICO-ISCHEMICA EII

Conseguenze, cause e malasanità



Cos'è l'EII?

L'EII è una forma di lesione cerebrale causata da apporto limitato di ossigeno al cervello. Conosciuta anche come asfissia neonatale o asfissia intrapartum, l'EII si verifica quando un bambino soffre di carenza di ossigeno intorno al momento del parto a causa di complicazioni gestite male, malattie o problemi del travaglio e parto.




Quali sono le CAUSE DI EII?

Come indicato sopra l'EII può risultare da qualsiasi evento che limiti il flusso di sangue ossigenato al cervello. In questa sezione, elencheremo alcune cause specifiche di encefalopatia ipossico-ischemica che possono verificarsi prima, durante e dopo il travaglio e il parto.



- TRAUMI ALLA NASCITA**
 - Ritardo nel parto cesareo d'urgenza
 - Travaglio prolungato o arrestato
 - Gravidanza oltre il termine
 - Errori nell'esecuzione dell'analgia/anestesia
 - Emorragie intracraniche
 - Errori nel monitoraggio del feto
- DIMENSIONI E PRESENTAZIONI ANOMALE**
 - Sproporzione cefalo-pelvica (CPD)
 - Presentazione podalica
 - Presentazione di faccia
 - Macrosomia
- PROBLEMI NEL PARTO E NEL TRAVAGLIO**
 - Sovradosaggio di farmaci per l'induzione del parto
 - Rottura dell'utero
 - Distacco della placenta
 - Problemi del cordone ombelicale: prolasso, compressione, avvolgimento al collo e lunghezza insufficiente
 - Placenta previa
 - Insufficienza uteroplacentale
 - Rottura prematura delle membrane



- PROBLEMI DI SALUTE MATERNI**
 - Preeclampsia
 - Polidramnios
 - Oligoidramnios
- PROBLEMI DI SALUTE DEL FETO O DEL NEONATO**
 - Ictus fetale
 - Gestione errata di problemi respiratori del neonato
 - Gestione errata dell'anemia del neonato



Encefalopatia ipossico-ischemica ed errori medici

Poiché le lesioni associate all'encefalopatia ipossico-ischemica sono così gravi, ci si aspetta che lo staff che assiste la gestante rilevi, diagnostichi, eviti e tratti accuratamente qualsiasi scenario che possa portare ad una privazione dell'ossigeno nel feto.

Di seguito, si indicano alcune ipotesi di condotte mediche censurabili che possono causare EII. Se tu o una persona cara avete vissuto scenari simili durante la gravidanza ed il parto, vi esortiamo a chiedere assistenza legale.



Mancata rilevazione e trattamento di segni di pericolo fetale risultanti dal tracciato CTG



Mancata diagnosi e trattamento di infezioni della madre o del bambino durante la gravidanza e il parto



Mancata rilevazione ed approfondimento diagnostico di eventuali fattori di rischio, segni e sintomi di EII



Mancata diagnosi e cura di patologie occorse alla madre ed al bambino durante gravidanza, parto e periodo post-partum